

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Allergo-COMOD® krople do oczu ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po 10 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Allergo-COMOD®

20 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Natrii cromoglicas

Skład:

1 ml izotonicznego roztworu zawiera substancję czynną: sodu kromoglikan - 20 mg.

Substancje pomocnicze:

Disodu edetynian, sorbitol, woda do wstrzykiwań.

Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z odpowietrzoną pompką zawierająca 10 ml kropli do oczu.

Podmiot odpowiedzialny

URSAPHARM Arzneimittel GmbH & Co. KG

Industriestrasse 35

D-66129 Saarbrücken

Niemcy

Wytwórca: URSAPHARM Arzneimittel GmbH & Co. KG

Industriestrasse 35

D-66129 Saarbrücken

Niemcy

Spis treści

1. Co to jest Allergo-COMOD® krople do oczu i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się Allergo-COMOD® krople do oczu
3. Jak stosować Allergo-COMOD® krople do oczu
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie Allergo-COMOD® krople do oczu
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Allergo-COMOD® krople do oczu

1. Co to jest Allergo-COMOD® krople do oczu i w jakim celu się go stosuje

Wskazaniem do stosowania jest ostre i przewlekłe alergiczne zapalenie spojówek np. zapalenie spojówek spowodowane katarzem siennym, wiosenne alergiczne zapalenie rogówki i spojówek.

2. Zanim zastosuje się Allergo-COMOD® krople do oczu

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie są znane interakcje kromoglikanu sodu z innymi lekami stosowanymi równocześnie miejscowo do oczu.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lekarz okulista powinien stwierdzić, czy pomimo występującego alergicznego zapalenia oka, możliwe jest używanie soczewek kontaktowych. W przypadku uzyskania potwierdzenia, przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe, zakropić lek, a soczewki założyć ponownie na oczy po upływie 15 minut.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek:

Stosowanie Allergo-COMOD® krople do oczu u dzieci:

Bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci poniżej 4 lat nie zostało określone.

Ciąża:

Brak danych dotyczących wpływu leku na płód. Leku nie należy stosować w I trymestrze ciąży i nie zaleca się stosowania w dalszym okresie ciąży.



URSAPHARM
ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG

Karmienie piersią:

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić przemijające zaburzenia widzenia, co może wydłużyć czas reakcji u osób prowadzących pojazdy oraz obsługujących maszyny.

Ważne informacje o niektórych składnikach Allergo-COMOD® krople do oczu:

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować Allergo-COMOD® krople do oczu

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Zazwyczaj zaleca się zakropić do worka spojówkowego 1 kroplę 4 razy na dobę. Dla dorosłych i dzieci dawkowanie jest takie samo.

Nie dotykać końcówką zakraplacza do oka, powieki, okolic oka ani innych powierzchni.

W przypadku użycia większej dawki leku:

Nie odnotowano przypadków przedawkowania. Nie jest znane specjalne leczenie w takim przypadku.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Allergo-COMOD® krople do oczu może powodować działania niepożądane.

W rzadkich przypadkach może wystąpić przemijające pieczenie oczu, uczucie obecności ciała obcego w oku, przekrwienie i obrzęk spojówek. Objawy te zwykle samoistnie ustępowały. W przypadku podejrzenia wystąpienia uczulenia na krople Allergo-COMOD® pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie Allergo-COMOD® krople do oczu

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Po pierwszym otwarciu butelki krople mogą być stosowane przez 12 tygodni.

Przechowywać w temperaturze do 25°C.

6. Inne informacje

Preparat nie zawiera konserwantów.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

