

ULOTKA DLA PACJENTA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Cholinex Intense

Hexylresorcinolum + Benzalkonii chloridum

2,5 mg + 1,2 mg, tabletki do ssania

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Cholinex Intense ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po 7 dniach u dorosłych lub po 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasiliły się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Cholinex Intense i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cholinex Intense
3. Jak stosować lek Cholinex Intense
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Cholinex Intense
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CHOLINEX INTENSE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tabletki do ssania Cholinex Intense zawierają działający miejscowo znieczulająco

i przeciwbakteryjnie heksylrezorcynol oraz chlorek benzalkoniowy o działaniu przeciwbakteryjnym.

Tabletki do ssania Cholinex Intense stosuje się objawowo w bólu i zapaleniu gardła.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CHOLINEX INTENSE

Kiedy nie stosować leku Cholinex Intense

- jeśli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na heksylrezorcynol, chlorek benzalkoniowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
- jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów (glukozy, sacharozy, fruktozy).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cholinex Intense

Jedna tabletka zawiera ok. 1,2 g sacharozy i ok. 1,2 g glukozy. Osoby chore na cukrzycę powinny uwzględnić tę ilość cukru w swojej diecie.

Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 7 lat.

Stosowanie leku Cholinex Intense z innymi lekami

Nie stwierdzono oddziaływania leku Cholinex Intense z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Cholinex Intense na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cholinex Intense

Lek zawiera sacharozę i glukozę, patrz punkty „Kiedy nie stosować leku Cholinex Intense” oraz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cholinex Intense”.

Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej i czerni brylantowej lek może powodować reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CHOLINEX INTENSE

Lek Cholinex Intense należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce.

Należy powoli ssać tabletkę.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Przyjmować jedną tabletkę co trzy godziny; nie więcej niż 8 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku od 7 do 12 lat:

Przyjmować jedną tabletkę co trzy godziny; nie więcej niż 4 tabletki na dobę.

Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 7 lat.

Nie stosować dawki większej niż zalecana. W razie utrzymywania się objawów należy zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Cholinex Intense jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cholinex Intense

Przedawkowanie heksylorazorcynolu może spowodować podrażnienie żołądka i jelit.

Po odstawieniu leku należy zastosować leczenie objawowe.

Po przyjęciu zbyt dużej dawki leku mogą wystąpić nudności, wymioty, biegunka, obfite pocenie się i zwiększone pragnienie związane z nadmiernym spożyciem lewomentolu.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Cholinex Intense

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Cholinex Intense może powodować działania niepożądane.

Mogą wystąpić miejscowe podrażnienia lub stany zapalne w obrębie jamy ustnej i gardła.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CHOLINEX INTENSE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Cholinex Intense

- Substancjami czynnymi leku są heksylorezorcynol i chlorek benzalkoniowy. Jedna tabletkę do ssania zawiera 2,5 mg heksylorezorcynolu i 1,2 mg chlorku benzalkoniowego.
- Inne składniki leku to sacharoza i płynna glukoza (50:50), glikol propylenowy, kwas cytrynowy jednowodny, lewomentol, aromat jeżynowy 500948E, czerwień koszenilowa, czern brylantowa.

Jak wygląda lek Cholinex Intense i co zawiera opakowanie

Lek Cholinex Intense jest w postaci jasnofioletowych, okrągłych, obustronnie wypukłych tabletek do ssania.

Dostępne opakowania

10, 12, 16, 20 lub 24 tabletki do ssania.

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa
Tel. (22) 576 9600

Wytwórca

Ernest Jackson&Co Ltd., High Street, Crediton, Devon EX17 3AP, Wielka Brytania

Data zatwierdzenia ulotki: