

160 mm

Ulotka informacyjna dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Taconal

(Mupirocinum)
20 mg/g maść

Skład:

1 g maści zawiera:
substancję czynną: 20 mg mupirocyny,
substancje pomocnicze:
makrogol 3350, makrogol 400.

Dostępne opakowania:

Tuba zawierająca 3 g, 8 g lub 15 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
95-200 Pabianice
ul. Partyzancka 133/151
Polska

Wytwórca:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
95-200 Pabianice
ul. Partyzancka 133/151
Polska

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Taconal i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Taconal
3. Jak stosować lek Taconal
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Taconal
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Taconal

1. Co to jest lek Taconal i w jakim celu się go stosuje

Taconal jest maścią do stosowania miejscowego na skórę. Taconal zawiera antybiotyk mupirocynę, działający na bakterie powodujące większość zakażeń skóry, np. na *Staphylococcus aureus*, w tym na szczepy metycylinooporne, oraz inne gronkowce lub paciorkowce.

Wskazania:

Taconal wskazany jest do miejscowego leczenia bakteryjnych zakażeń skóry (np. liszajca, zapalenia mieszków włosowych oraz czyraczności) wywołanych przez bakterie *Staphylococcus aureus*, w tym przez szczepy metycylinooporne, oraz inne gronkowce lub paciorkowce.

2. Zanim zastosuje się lek Taconal

Leku nie należy stosować:

- w nadwrażliwości na mupirocynę lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych leku,
- do oczu i do nosa,
- na błony śluzowe,
- u pacjentów z rozległymi oparzeniami.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Taconal

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. W przypadku stosowania na twarzy, należy unikać kontaktu leku z oczami. Jeśli wystąpi reakcja nadwrażliwości lub ciężkie miejscowe podrażnienie skóry, należy przerwać leczenie, zmyć lek z powierzchni skóry i skonsultować się z lekarzem, w celu zastosowania właściwego leczenia przeciwbakteryjnego. Tak jak w przypadku innych leków przeciwbakteryjnych, stosowanie leku Taconal dłużej niż jest to zalecane, może spowodować powstawanie szczepów opornych na substancję czynną – antybiotyk mupirocynę.

Stosowanie leku Taconal u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

Ze względu na zawartość makrogoli w leku, które mogą się wchłaniać do organizmu z otwartych ran i uszkodzonej skóry, a następnie ulec wydaleniu przez nerki, lek ten powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Lek Taconal może być używany podczas ciąży i w okresie karmienia piersią wyłącznie wtedy, kiedy lekarz uzna to za konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie obserwowano wpływu mupirocyny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych ostatnio lekach, nawet tych wydawanych bez recepty. Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

3. Jak stosować lek Taconal

Lek Taconal należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Lek Taconal należy nanosić na zmienione chorobowo miejsca na skórę od 2 do 3 razy w ciągu doby, przez okres do 10 dni. Zaleca się nałożyć niewielką ilość leku na zmienione chorobowo miejsce na skórę za pomocą kawałka czystej waty lub gazika. W razie potrzeby leczoną powierzchnię skóry można pokryć opatrunkiem okluzyjnym.

Nie należy mieszać leku z innymi lekami lub stosować na skórę jednocześnie z innymi lekami, gdyż istnieje ryzyko utraty działania przeciwbakteryjnego (w wyniku rozcieńczenia) oraz stabilności mupirocyny. Przed zastosowaniem leku zmienioną chorobowo skórę należy umyć mydłem i wodą, a następnie starannie osuszyć. W przypadku wrażenia, że działanie leku Taconal jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana leku Taconal:

Toksyczność mupirocyny jest bardzo mała. Objawy przedawkowania nie są znane. W przypadku przedawkowania powinno być zastosowane leczenie objawowe. W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku Taconal:

Należy zastosować lek jak najszybciej. Jednakże w przypadku, gdy zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki maści należy pominąć opuszczoną dawkę i zastosować następną zgodnie z zaleconym schematem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Taconal może powodować działania niepożądane.

Częste (występujące rzadziej niż u jednego pacjenta na 10, ale częściej niż u jednego pacjenta na 100): pieczenie w miejscu nałożenia leku.

Niezbyt częste (występujące rzadziej niż u jednego pacjenta na 100, ale częściej niż u jednego pacjenta na 1000): swędzenie, rumień, uczucie klucia oraz suchości w miejscu nałożenia leku, skórne reakcje nadwrażliwości na mupirocynę lub substancje pomocnicze leku.

Bardzo rzadkie (występujące rzadziej niż u jednego pacjenta na 10 000): ogólnoustrojowe reakcje nadwrażliwości.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Taconal mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia powyższych i innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Taconal

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku Taconal po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.

6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Taconal

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
95-200 Pabianice
ul. Partyzancka 133/151
Tel. (042) 225 31 00



Data opracowania ulotki: 22.02.2011

140 mm

202