

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek HASCOVIR pro ostrożnie i zgodnie z informacją na ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach należy skontaktować się z lekarzem.

HASCOVIR pro (Aciclovirum) 50 mg/g, krem

Skład

1 g kremu zawiera:

substancję czynną: 50 mg acyklowiru

substancje pomocnicze: glikol propylenowy, poloxamer 407, alkohol cetostearylowy, sodu laurylosiarczan, parafina ciekła lekka, wazelina biała, woda oczyszczona.

Dostępne opakowanie

Tuba aluminiowa zawierająca 5 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Hascovir pro, krem i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Hascovir pro, krem
3. Jak stosować lek Hascovir pro, krem
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Hascovir pro, krem
6. Inne informacje

1. Co to jest lek Hascovir pro, krem i w jakim celu się go stosuje

Lek Hascovir pro, krem zawiera substancję czynną acyklowir. Acyklowir po zastosowaniu na skórę wykazuje silne działanie przeciw wirusowi opryszczki pospolitej (*Herpes simplex*).

Wskazania

Lek Hascovir pro stosowany jest w miejscowym leczeniu objawów opryszczki wargowej (tzw. zimna) oraz zmian opryszczkowych na twarzy, wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej (*Herpes simplex*).

2. Zanim zastosuje się lek Hascovir pro, krem

Nie należy stosować leku Hascovir pro w nadwrażliwości na substancję czynną - acyklowir, walacyklowir oraz glikol propylenowy, alkohol cetostearylowy lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Hascovir pro, krem

Leku nie należy stosować na błonę śluzową jamy ustnej oraz do oczu, gdyż może powodować podrażnienia.

Lek powinien być stosowany wyłącznie na opryszczkę umiejscowioną na wargach i twarzy. Nie należy stosować leku na błony śluzowe oraz w leczeniu opryszczki narządów płciowych. Należy stosować lek bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do kontaktu leku z oczami.

Jeśli wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka wargowa, należy zwrócić się do lekarza.

Osoby z obniżoną odpornością nie powinny stosować leku bez konsultacji z lekarzem.

Podczas leczenia nie należy zdrapywać pęcherzyków i strupów, ani dopuszczać do ich uszkodzenia, szczególnie podczas mycia i osuszania skóry.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa przeniesienia zakażenia na inne osoby, nie należy pozwalać im na dotykanie opryszczkowych zmian skórnych, używanie wspólnych ręczników itp.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, lek może powodować podrażnienie skóry.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Stosowanie innych leków

Nie są znane interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Hascovir pro, krem

Lek przeznaczony jest tylko do stosowania miejscowego na skórę.

Zmiany opryszczkowe i bezpośrednie ich okolice należy smarować niewielką ilością leku 5 razy na dobę (co 4 godziny). Najlepiej rozpocząć leczenie w momencie wystąpienia pierwszych objawów zakażenia (uczucie swędzenia, pieczenia lub klucia). Natychmiastowe zastosowanie leku w okresie nawrotu choroby może całkowicie zapobiec jej rozwojowi.

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
11.11.2015

Aby zapobiec przenoszeniu zakażenia na inne miejsca na skórze, należy umyć ręce przed i po zastosowaniu leku.

Leczenie powinno trwać 5 dni. Jeżeli po tym czasie objawy nie ustąpią, leczenie można przedłużyć o kolejne 5 dni. Gdy po 10 dniach objawy chorobowe nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Hascovir pro jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku Hascovir pro, należy możliwie jak najszybciej wznowić kurację.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Hascovir pro może powodować działania niepożądane.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów stosujących lek):

- łagodne wysuszenie lub złuszczenie skóry.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów stosujących lek):

- przemijające uczucie pieczenia lub mrowienia,
- swędzenie.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

- rumień,
- kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu leku.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

- nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie, jak obrzęk naczynioruchowy.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, również niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Hascovir pro, krem

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Hascovir pro po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Nie zamrażać.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E
tel. (071) 352 95 22

Dział Informacji o Leku
tel. (022) 742 00 22

Data opracowania ulotki:

2008-05-05
MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15