



ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Neosine, 500 mg, tabletki
Inosinum pranobexum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki

- 1 Co to jest lek Neosine i w jakim celu się go stosuje
- 2 Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neosine
- 3 Jak stosować lek Neosine
- 4 Możliwe działania niepożądane
- 5 Jak przechowywać lek Neosine
- 6 Inne informacje

1 Co to jest lek Neosine i w jakim celu się go stosuje

Neosine jest lekiem przeciwwirusowym i zwiększającym odporność (pobudza czynność układu odpornościowego).

Wskazania do stosowania leku Neosine:

- **zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane przez wirus opryszczki zwykłej typu I (opryszczka wargowa) lub typu II (opryszczka okolicy płciowej) oraz ospy wietrznej i półpaśca,**
- **inne zakażenia wywołane przez wirusy** (np. podostre stwardniające zapalenie mózgu, będące powikłaniem odry),
- **wspomagająco u osób o obniżonej odporności.**

2 Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neosine

Kiedy nie stosować leku Neosine

- Jeśli pacjent **ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku** (patrz punkt 6). Objawami uczulenia mogą być: wysypka skórna, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.

- Jeśli pacjent **ma aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.**

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Neosine

Przed zastosowaniem leku Neosine pacjent powinien poinformować lekarza:

- **jeśli chorował na dnę moczanową lub miał podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi i w moczu;**
- **jeśli chorował na kamice nerkową;**
- **jeśli ma zaburzenia czynności nerek;** podczas stosowania leku Neosine lekarz będzie regularnie badał krew i kontrolował pracę nerek;
- **jeśli leczenie jest długotrwałe** (trwa 3 miesiące lub dłużej) lekarz zleci regularne badania krwi oraz pracy nerek.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje:

- leki do leczenia dny moczanowej (np. allopurinol lub inne leki),
- leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, w tym leki moczopędne (zwiększające wytwarzanie moczu), np. furosemid, torasemid, kwas etakrynowy, hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid,

- leki hamujące czynność układu odpornościowego (tak zwane leki immunosupresyjne, stosowane u pacjentów po przeszczepieniu narządów lub w atopowym zapaleniu skóry),

- **azydotymidynę** (lek stosowany w leczeniu choroby AIDS).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy przyjmować leku Neosine w okresie ciąży i karmienia piersią. Lekarz oceni, czy korzyści ze stosowania leku przewyższają potencjalne ryzyko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn jest niewielki.

Jeśli wystąpi ból głowy, zawroty głowy lub uczucie senności, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych czynności wymagających koncentracji.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Neosine

Lek zawiera skrobię pszeniczną. Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią (uczuleniem) na pszenicę (inną niż celiakia – zwana chorobą trzewną). Lek Neosine mogą stosować pacjenci z celiakią.

3 Jak stosować lek Neosine

Lek Neosine należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Dawki leku i długość leczenia ustala lekarz. Wielkość dawki zależy od masy ciała pacjenta i rodzaju choroby.

Lek należy stosować doustnie.

Zazwyczaj stosowana dawka leku

- Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę (zwykle 1 g, tj. 2 tabletki 3 razy na dobę).

Nie należy przyjmować więcej, niż 8 tabletek na dobę.

- Dzieci w wieku powyżej 1 roku

Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych.

Dla dzieci, które nie umieją połknąć tabletek, zaleca się podawanie leku Neosine w syropie.

- Uwaga dotycząca wszystkich grup wiekowych

W ciężkich zakażeniach (np. podostre stwardniające zapalenie mózgu w ostrej fazie choroby) lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg na kg masy ciała na dobę, podzieloną na równe dawki podawane co 4 godziny.

Sposób podawania

Tabletkę należy popić dużą ilością

plynu, najlepiej wodą. W razie trudności z połknięciem całej tabletki, tabletkę można pokruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości wody.

Czas trwania leczenia

Lekarz określi, jak długo należy przyjmować lek.

Leczenie zwykle trwa od 5 do 14 dni. Zaleca się, aby po ustąpieniu objawów choroby przyjmować lek jeszcze przez 1 do 2 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neosine

Brak danych dotyczących przedawkowania leku Neosine.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Neosine

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć dawkę tak szybko, jak to jest możliwe i kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Neosine

O zakończeniu leczenia decyduje lekarz.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4 Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Neosine może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 osób):

- przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi,
- podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi,
- nudności, wymioty,
- ból brzucha,
- wysypka skórna (czerwone, swędzące grudki na skórze),
- ból głowy, zawroty głowy,
- zmęczenie lub złe samopoczucie,
- bóle stawów.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 osób):

- biegunka,
- zaparcia,
- nerwowość,
- senność lub trudności w zasypianiu (bezsenna),
- wydalenie dużej ilości moczu (wielomocz).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5 Jak przechowywać lek Neosine

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze

i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6 Inne informacje

Co zawiera lek Neosine

Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4 acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamonowy w stosunku molowym 1:3). Jedna tabletki zawiera 500 mg inozyny pranobeksu.

Ponadto lek zawiera: skrobię pszeniczną, mannitol, powidon, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Neosine i co zawiera opakowanie

Lek Neosine ma postać tabletek. Tabletki są podługne, owalne, obustronnie wypukłe, z linią podziału po jednej stronie. Linia umożliwiająca podział tabletki w celu jej łatwiejszego połknięcia.

Opakowanie zawiera 20 tabletek (dwa blistry po 10 tabletek) lub 50 tabletek (pięć blisterów po 10 tabletek). Blistry pakowane są w tekturowe pudełko.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Afolfarm Fabryka Leków Sp. z o.o.
ul. Szkolna 31, 95-054 Ksawerów
Tel.: 42 212 16 95

Data zatwierdzenia ulotki:
2010-12-02